




Arméria des sables

Armeria arenaria (Pers.) Schult. Famille des Plumbaginaceae

Cette plante longiligne de la famille des plumbaginacées se termine par une inflorescence en forme de pompon. Une longue tige de 40 à 60 cm sépare la base où pousse les feuilles de la fleur.

Sa floraison intervient entre juin/juillet et septembre.

Ses feuilles sont lancéolées, très étroites et toutes disposées à la base.



Biscutelle de Lamotte

Biscutella lamottei Jord. Famille des Brassicaceae

Biscutelle du groupe très complexe de *B. laevigata*.

Aussi appelée la lunetière de Lamotte, elle mesure de 20 à 40 cm.

Sa floraison dure de mai à août et a pour caractéristique de produire de petites poches vertes-jaunes ressemblant fortement à des lentilles de vue, d'où son nom de «lunetière».



Fausse Spirée

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Famille des Rosaceae

Comme son nom l'indique elle pousse souvent dans les prés, humides de préférence où elle forme de grandes populations. Voilà une plante de la famille des rosacées qui, à première vue n'a pas grand chose à voir avec la rose, sauf si on prend le temps de l'examiner d'un peu près. On y découvrira alors quelques ressemblances avec sa cousine :

- feuilles composées, 5 pétales et de nombreuses étamines.

Elle se distingue par

- ses grandes tiges au port royal terminées par des corymbes de petites fleurs blanches, serrées, parfumées.
- Cette plante vivace est haute de 50cm à 1m50 et ses feuilles composées se caractérisent par leurs folioles sessiles, dentées, disposées par paires, alternativement grandes et petites.



Marguerite du Midi

Leucanthemum meridionale Legrand Famille des Asteraceae

C'est une plante vivace, avec une ou plusieurs tiges, aux feuilles inférieures dentées sur les bords et aux nombreuses fleurs qui ressemblent à la Marguerite commune des prairies (*Leucanthemum vulgare*), entourées à leur base d'écailles pâles ou bordées de brun. Sa floraison s'étend de mai à juillet.



Tabouret de Firmi

Noccea caerulescens subsp. firmiensis (F.K.Mey.) B.Bock Famille des Brassicaceae

Plante d'une vingtaine de centimètres de haut; feuilles glaucescentes; fleurs à pétales blancs lavés de rose. Le fruit est une silicule échancrée peu profondément. Elle fleurit de mars à mai.



Doradille de Maranta

Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing Famille des Pteridaceae

Cette fougère mesure de 10 à 30cm. Elle forme des touffes assez denses, de couleur vert foncé sur le dessus et entièrement couvertes d'écailles en-dessous, vrillées qui se recroquevillent lors de périodes de sécheresse. Les meilleures périodes pour l'observer sont de mai à septembre.




Scille d'automne

Prospero autumnale (L.) Speta Famille des Asparagaceae

Plante vivace de petite taille, glabre, à bulbe gros, ovale et blanchâtre, avec des feuilles basales, linéaires et très étroites, poussant parfois après les fleurs. Ces dernières forment des grappes, ou racèmes, assez denses. Le périanthe est constitué de six tépales (trois sépales et trois pétales identiques) de couleur généralement lilas ou violet assez pâle, plus rarement blancs. Six étamines à anthères violettes ou noirâtres. Le fruit est une capsule.

C'est une plante qui fleurit d'août à octobre.



Chêne des Pyrénées

Quercus pyrenaica Willd. Famille des Fagaceae

Le chêne tauzin est un arbre de 5 à 20 mètres de haut de forme irrégulière se ramifiant dès la base mais finissant par perdre ses branches les plus basses. Son écorce est lisse de couleur vert grisé puis gris sombre d'où son surnom de chêne noir. Il se reconnaît à ses feuilles très découpées, au débourrement tardif, et abondamment duveteuses sur les deux faces.

Sa feuillaison est tardive (mai). Ses feuilles alternes mesurant jusqu'à 20 cm sont pennatilobées et présentent 4 à 8 lobes profondément échancrés. Elles sont pubescentes avec une forte tomentosité blanche notamment en face inférieure. Le pétiole poilu est court (8 à 10 mm).

Sa floraison s'étend de mai à juin.

Sa longévité peut atteindre 500 ans. Il s'hybride facilement avec d'autres chênes.



Orpin âcre

Sedum acre L. Famille des Crassulaceae

L'Orpin jaune, ou Orpin âcre, aussi appelé Orpin brûlant ou Poivre des murailles, est une plante vivace de la famille des Crassulacées.

- Plante de 4-8 cm, glabre, verte, densément gazonnante, à saveur piquante.
- Souche grêle émettant de nombreux rejets stériles à feuilles densément imbriquées.
- Fleurs d'un jaune vif, sessiles, 2-5 sur chacun des 2-3 épis rapprochés en petit corymbe.
- Pétales étalés, lancéolés-aigus, 1-2 fois plus longs que le calice.
- Feuilles persistantes de 3 à 6 mm, alternes, ovales-cylindriques.



Serpolet

Thymus serpyllum L. Famille des Lamiaceae

Le Thym serpolet est une plante vivace de 5 à 30cm de haut. Il émet de longues tiges couchées qui forment une sorte de gazon. Il a de très petites feuilles opposées ovales ou lancéolées, aux courtes hampes florales dressées. De juin à septembre, son feuillage aromatique vert à reflets pourprés sous le soleil disparaît littéralement sous une nuée de petites fleurs bleues groupées en capitules terminaux

Il fleurit entre mai et septembre.